

Übertragbare Krankheiten und Erreger

Erreger	Übertragungsweg	Krankheit/Symptom	Erweiterte Schutzmaßnahmen (in Ergänzung zur Basishygiene)	Dauer der Maßnahmen/ Bemerkungen
Parvovirose Parvovirus	Schmierinfektion	Durchfall Erbrechen Leukopenie Mattigkeit Inappetenz	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit viruzider Wirkung	Bis zur Entlassung oder bis zu 3 Wochen nach Abklingen der Symptome
Feline Panleukopenie Parvovirus	Schmierinfektion	Inappetenz Panleukopenie Fieber Evtl. Diarrhoe/ Vomitus	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit viruzider Wirkung	Bis zur Entlassung oder bis zu 3 Wochen nach Abklingen der Symptome
RHD Rabbit Haemorrhagic Disease	Kontaktinfektion Stechmücken	Plötzliches Sterben von Tieren aus dem Bestand Apathie Fieber Inappetenz Blutungen aus Körperöffnungen	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert
Katzenschnupfen (teils Zoonosen) Feline Calici Virus Chlamydomphila felis Felines Herpesvirus Bordatella bronchiseptica Mykoplasmen Feline Resp. Coronavirus	Tröpfcheninfektion	Fieber Rhinitis Konjunktivitis/Keratitis Nasenausfluss Schleimhautulzeration Pneumonie	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit begrenzt plus viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert
Zwingerhusten (teils Zoonosen) Bordatella bronchiseptica Parainfluenza Canines Adenovirus -2 Canines Influenzavirus A Canines Resp. Corona Virus Canines Herpesvirus Mykoplasmen	Tröpfcheninfektion	Fieber Husten/Würgen Laryngitis/Pharyngitis Pneumonie	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit begrenzt plus viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert
Staupe Canines distemper virus	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion	Respiratorische Symptome Durchfall/Vomitus Neurologische Störungen	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit begrenzt viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert

Übertragbare Krankheiten und Erreger

Erreger	Übertragungsweg	Krankheit/Symptom	Erweiterte Schutzmaßnahmen (in Ergänzung zur Basishygiene)	Dauer der Maßnahmen/ Bemerkungen
Hepatitis contagiosa canis Canines Adenovirus -1	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion	Fieber, Apathie Vomitus Petechien Lymphadenopathie Hepatitis Hepatoenzephalopathie	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit begrenzt viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert
Leptospirose Leptospiren (Zoonose)	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion Harn/Blut	Anorexie, Vomitus, Fieber, Ikterus-Leberversagen, Hämorrhagien, Azotämie bis akutes Nierenversagen, Dyspnoe	Isolation Schutzkleidung Desinfektion	Solange die stationäre Unterbringung andauert
Dermatophytose Microsporum canis (Zoonose)	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion	Alopezie Follikulitis Furunkulose evtl. Pruritus	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit Sauerstoffspalter	Solange die stationäre Unterbringung andauert
Salmonella spp (Zoonose)	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion Nahrungsmittel (BARF)	Vomitus Diarrhoe Anorexie Sepsis	Isolation Schutzkleidung Desinfektion	Solange die stationäre Unterbringung andauert; 1-6 Monat nach Infektionsbeginn
Feline Infektiöse Peritonitis (Felines Coronavirus)	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion	Anorexie Fieber Dyspnoe-Pleuraerguss Ergüsse Ikterus Uveiti Chorioretinitis Anämie Neurologische Symptome	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit begrenzt viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert
FeLV Feline Leukämievirus	Schmierinfektion/ Kontaktinfektion	Unspezifisch (Fieber Dyspnoe, Diarrhoe Vomitus, Inappetenz, Anorexie), Anämie, Leukämie, Lymphadenopathie, Lymphom/Lymphosarkom	Isolation Schutzkleidung Desinfektion mit begrenzt viruzider Wirkung	Solange die stationäre Unterbringung andauert
MRE/MRSA ESBL Zoonosen Acinetobacter spp E. coli Enterococcus		Unspezifisch Wund-/Katheterinfektion Pneumonien Fieber	Isolation Schutzkleidung Desinfektion	Bis zur vollständigen Erregersanierung